



КОМУ И КОГДА НУЖНО ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ КОРИ?



РОСПОТРЕБНАДЗОР




Прививку обязательно делать
всем **детям в возрасте 1 года**

ревакцинация проводится в 6 лет



РОСПОТРЕБНАДЗОР

**Детям старше 6 лет и взрослым
вакцинация рекомендуется
при ее отсутствии ранее
или при однократном введении
вакцины**



РОСПОТРЕБНАДЗОР

До 36 лет введение вакцины
рекомендуется всем

После 36 лет –
при высокой вероятности контактов
в первую очередь: медработники,
работники транспорта,
детских садов, школ



РОСПОТРЕБНАДЗОР



**Старше 55 лет –
только при контактах с больными**



РОСПОТРЕБНАДЗОР



ЕСТЬ ВАКЦИНА! КОРЬ



Корь - очень
заразная инфекция
со

100%

вероятностью
заражения
непривитых


Осложнения
пневмония, отит,
синусит, гепатит,
панкреатит,
миокардит,
кератит
Самое
опасное -
энцефалит!



Защитный эффект
коревой вакцины
после двух
введений более

95%

Симптомы
лихорадка, кашель,
насморк,
конъюнктивит,
сыпь на коже
и во рту



Сегодня с корью
связано около

10%

всех летальных
исходов среди детей
до 5 лет
в развивающихся
странах

Вакцинация
самая эффективная
мера
профилактики
кори



КОРЬ

одна из самых заразных болезней, известных на сегодня



ПУТЬ ЗАРАЖЕНИЯ:
воздушно-капельный (при кашле, чихании)



В ЗОНЕ РИСКА:
непривитые дети и взрослые



ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ:
больной человек в последние 2 дня скрытого периода, в течение всего натарального периода и до 4-го дня после появления сыпи



ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД:
7-14 дней

ВОЗБУДИТЕЛЬ-ВИРУС



СИМПТОМЫ КОРИ

1

Повышение температуры 38-40 °С

2

Насморк, сухой навязчивый кашель, конъюнктивит

3

Покраснение и отечность слизистой оболочки глотки

4

Увеличение шейных лимфатических узлов, вялость, плохой сон

5

Пятнисто-папулезная сыпь

ЧТО ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ ВЫ?

При малейших подозрениях на корь следует немедленно обратиться к врачу



СПЕЦИФИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КОРИ НЕТ

ЛЕЧЕНИЕ СИМПТОМАТИЧЕСКОЕ

Постельный режим

Обильное питье

Жаропонижающее

Средства от насморка и боли в горле

Отхаркивающие препараты

Витамины

ОСЛОЖНЕНИЯ



Отит, слепота, бронхопневмония, воспаление шейных лимфоузлов, ларингит, энцефалит



В случае развития осложнений, дальнейшее лечение проводят в стационаре

ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ У ЧЕЛОВЕКА ОСТАЕТСЯ ПОЖИЗНЕННЫЙ ИММУНИТЕТ

ПРОФИЛАКТИКА



Надежным и эффективным методом профилактики является **ВАКЦИНАЦИЯ**, которая проводится детям в 12 месяцев, ревакцинация - в 6 лет



Взрослым, не болевшим корью или не имеющим сведений о прививках, также рекомендуется прививаться дважды



Вакцинация проводится бесплатно в поликлинике по месту жительства

НЕ ОТКАЗЫВАЙТЕСЬ ОТ ВАКЦИНАЦИИ! ЭТО ПОМОЖЕТ СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ!



Экстренная вакцинация в очаге кори

проводится независимо от возраста всем контактным, кто не болел корью, не привит или не имеет сведений о прививках.

Экстренная вакцинация проводится в кратчайшие сроки с момента выявления больного:

- **при близком контакте – в течение 72 часов,**
- **при отдаленном контакте – в течение 7 дней.**

Детям, не привитым против кори, не достигшим прививочного возраста, а также лицам с противопоказаниям к вакцинации, вводится иммуноглобулин человека нормальный не позднее 5-го дня от момента контакта.



Федеральное бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Центр гигиенического
образования населения»
Федеральной службы
по надзору в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия человека
г. Москва, 1-й Смоленский пер.,
д. 9, стр. 1
e-mail: cgon@cgon.ru;
тел.: 8 (499) 241 86 28



КОРЬ



Корь

очень заразная вирусная инфекция.

Восприимчивость

к кори составляет почти 100%.

Больной становится заразным за несколько дней до появления симптомов.

Источник инфекции

больной корью человек

Путь передачи

воздушно-капельный.
Вирус выделяется с капельками слюны во время чихания и кашля.



Вирус также передается от матери плоду во время беременности.

Симптомы

Заболевание начинается остро – поднимается температура, вплоть до 40*С, появляется кашель, насморк, конъюнктивит.

Характерный симптом кори – пятна Филатова-Коплика на слизистой оболочке щек – белые пятна, окруженные каймой.

Спустя несколько дней на коже появляется пятнисто-папулезная сыпь, которая может сливаться

Сначала сыпь появляется за ушами и на волосистой части головы, далее - на лице, шее и груди. Постепенно сыпь покрывает все туловище сверху вниз.

В течение 3-4 дней сыпь исчезает в той же последовательности, а на ее месте остается пигментация и шелушение.



Осложнения

пневмония, энцефалит, менингит, менингоэнцефалит, полиневрит, отит.


Самая эффективная мера профилактики – вакцинация.

Вакцинация проводится в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2021 г. N 1122н.

Детей прививают по схеме: вакцинация – в 12 месяцев, ревакцинация – в 6 лет.

Взрослым, не привитым, не болевшим и привитым однократно, прививки против кори проводят до 35 лет.

Декретированным контингентам – до 55 лет.





Корь

Схема вакцинации

Схема вакцинации:

- **V** – в 12 месяцев,
- **RV** – в 6 лет

Корь – одно из самых заразных инфекционных заболеваний: каждый больной заражает 9 из 10 контактировавших с ним **неиммунных к кори** людей.

